Radiologie & imagerie médicale : Cas cliniques & e-learning

Comment je fais une microbiopsie mammaire échoguidée

Drs Lucie REVEL & Clara CHAUSSET
CHU de Besançon

- **Lésion ACR 5** : anomalie évocatrice de cancer
 - *VPP de malignité > 95%*

- **Lésion ACR 4** : anomalie indéterminée ou apparue
 - *VPP de malignité= 2 – 95%*

- **Lésion ACR 3** : anomalie très probablement bénigne
 - *VPP de malignité < 2%*
 - Indication à une surveillance en imagerie à court terme sans prélèvement
 - Sauf dans certaines situations ou la biopsie est indiquée : cancer homo/controlatéral, femme a risque (BRCA1,2), homme.

A
C
R
5

A
C
R
4

A
C
R
3

- **Information** orale et écrite à la patiente sur les geste et explications des complications potentielles.
- **Précautions :**
 - Traitement anti-aggrégant: aucune
 - Traitement anticoagulant : arrêt préalable
 - Allergie à Xylocaïne
- **Revoir l'ensemble du dossier sénologique**
- **Installation** confortable de la patiente
- **Repérage de la lésion** sous échographie avec marquage cutané à la peau si cas difficile

Mélin

Protège sonde

Pistolet à biopsie automatique
(2 cm de débattement)

Aiguille 14G

Bistouri

Xylocaïne 1%

Gel d'échographie stérile

Seringue

- **Asepsie** cutanée
- Habillage stérile de la sonde d'échographie
- **Anesthésie** cutanée et sous cutanée à la Xylocaïne
- Incision du plan cutané au bistouri
- **Réalisation des prélèvements** en travaillant dans le grand axe de la sonde, parallèlement à la paroi thoracique :
 - *Contrôle permanent de l'avancée de l'aiguille*
 - *3 prélèvements minimum*
- Envoi des prélèvements en **anatomopathologie**
- **Pansement compressif**

- **Complications :**

- Hématome
- Infection

- **Limites : rares**

- Sein très fibreux limitant la progression de l'aiguille
- Lésions de petites taille (< 5mm) : mise en place d'un clip au décours

- ***Je suis rentré de 2 cm dans le sein, je vois la cible mais je ne vois pas l'aiguille, que faire ?***

Si j'ai piqué dans l'axe de la sonde :

1. Ne pas bouger la sonde,
2. Regarder sa sonde, pas l'écran
3. Faire un mouvement de translation de quelques mm dans l'axe de la sonde avec l'aiguille

Si je n'ai pas piqué dans l'axe de la sonde :

1. Je contrôle visuellement
2. Je me retire de quelques cm
3. Je réintroduis l'aiguille en la ré-axant dans le grand axe et au milieu de la sonde

- ***Je n'arrive pas à avancer dans le sein (fibreux), que faire ?***
 - Choisir un calibre d'aiguille plus petit (16G)

- ***La lésion est très dure, mon aiguille n'arrive pas à la transfixier lors du tir et recule, que faire ?***
 - Choisir un calibre d'aiguille plus petit (16 G), qui permettra de transfixier plus facilement la lésion

- ***La lésion est très profonde, j'ai peur de toucher la plèvre, que faire ?***
 - Injecter de la Xylocaïne sous la lésion afin de la décoller du plan profond

Radiologie & imagerie médicale : Cas cliniques & e-learning

MERCI POUR VOTRE ATTENTION